


A supporto del claim 80% dice "YES"

Indagine 2010 con partecipanti autonomi

Il MAM First Bottle è stato testato negli Stati Uniti, nel mese di gennaio 2010. Per questo a 207 mamme di bambini fino all'età di 6 mesi sono stati spediti due biberon First Bottle. Tutti i partecipanti sono stati reclutati da un'agenzia indipendente per la selezione del panel e solo il 7% di tutti i partecipanti avevano utilizzato i biberon MAM in precedenza.


Figura 1: Quali marchi di biberon utilizzati abitualmente? (Oltre ai biberon test)



n=166

Dopo 2-3 settimane di test le mamme sono state nuovamente interrogate. Di tutte le partecipanti, 118 hanno completato integralmente il questionario per questo secondo turno. In aggiunta alle altre funzioni dei biberon (facilità di utilizzo, il design, ecc.), le mamme sono state interrogate riguardo l'influenza del biberon First Bottle sulle coliche del loro bambino. All'inizio dell'indagine il 30% di tutti i bambini partecipanti soffriva di coliche. Delle mamme di questi 35 bambini, l'80% ha potuto confermare una riduzione delle coliche, di cui il 57% indicando una riduzione notevole o completa (vedi fig. 2).

Figura 2: Le coliche sono cambiate dopo l'uso del biberon MAM?



n=35