



Night Soother

Online Shop

FR

UTILISATION ET ENTRETIEN :

Par mesure d'hygiène, faire bouillir la sucette 5 minutes avant la première utilisation. Laisser refroidir 5 minutes avant de la donner au bébé. Si de l'eau pénètre dans la partie tétine de la sucette lors du nettoyage ou de la stérilisation : l'expulser en pressant la tétine. Nettoyer avant chaque utilisation à l'eau tiède et au savon. Si vous souhaitez stériliser, utiliser l'une des méthodes suivantes : stériliser dans de l'eau bouillante (laisser bouillir au moins 5 minutes), au micro-ondes en utilisant la stérilisation vapeur ou stérilisateur électrique (en respectant les instructions du fabricant), ou à froid avec des comprimés de stérilisation. Laisser refroidir toutes les parties après la stérilisation. Éviter les agents nettoyants agressifs ou abrasifs (détergent, liquide vaisselle). Ne jamais tremper la sucette dans un liquide sucré ou dans un médicament (risque de carie dentaire). Par mesure d'hygiène et de sécurité, remplacer la sucette au bout d'un ou deux mois d'utilisation. Dans le cas où la sucette se coince dans la bouche de votre bébé, NE VOUS AFFOLEZ PAS : elle ne peut pas être avalée et est conçue pour ce type de situation. Retirez-la très délicatement. MAM recommande de cesser l'utilisation des sucettes vers l'âge de 3 ans. Pour les sucettes nuit : garder la sucette à la lumière du jour – sans contact direct avec le soleil – pendant la journée pour que la sucette brille dans la nuit. Le bouton phosphorescent ne se recharge pas à la lumière d'une lampe LED.

Pour la sécurité de votre enfant :

AVERTISSEMENTS !

Avant chaque utilisation, examiner soigneusement la sucette. Tirer la sucette dans tous les sens. La jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité. • Utiliser uniquement des attache-sucettes conformes à l'EN 12586. Ne jamais attacher de ruban ou de cordon à la sucette, car votre enfant pourrait s'étrangler.

Ne pas exposer au soleil ou à la chaleur vive. Ne pas laisser tremper dans la solution de stérilisation plus longtemps qu'indiqué, cela risque de fragiliser la tétine.

